| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201155 | M67.4 | Ганглион | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>УЗИ области локализации ганглиона*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Местная анестезия*<br>Проводниковая анестезия*<br>Анестетики: прокаин*, лидокаин*. Операция.<br>Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин.<br>Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин.<br>Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам.<br>Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки.<br>ЛФК. Массаж. | 2 | 10 | Уменьшение сгибательной контрактуры суставов пальцев, улучшение функции конечности. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201156 | M67.4 | Ганглион | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>УЗИ области локализации ганглиона*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Местная анестезия*<br>Проводниковая анестезия*<br>Анестетики: прокаин*, лидокаин*. Операция.<br>Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин.<br>Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин.<br>Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам.<br>Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки.<br>ЛФК. Массаж. | 3 | 21 | Уменьшение сгибательной контрактуры суставов пальцев, улучшение функции конечности. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201157 | Q69.9 | Полидактилия неуточненная | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. Массаж. | 2 | 14 | Удаление добавочных пальцев, улучшение косметического вида кисти и функции кисти. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201158 | M06.2 | Ревматоидный бурсит | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава<br>УЗИ пораженного сустава<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог*<br>Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. Массаж. | 2 | 21 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201159 | M12.2<br>M14.0*<br>M14.1*<br>M14.5* | Ворсинчато-узелковый [виллонодулярный] синовит (пигментный);<br>Подагрическая артропатия вследствие ферментных дефектов и других наследственных нарушений;<br>Кристаллическая артропатия при других обменных болезнях;<br>Артропатия при других болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава<br>УЗИ пораженного сустава<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. Массаж. | 2 | 30 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201160 | M16 | Коксартроз [артроз тазобедренного сустава] | Ортопедический | консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава УЗИ пораженного сустава*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ГБО*. ЛФК. Массаж. | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201161 | M20.1<br>M22.0<br>M22.1<br>M23.6<br>M23.9<br>Q66.8 | Наружное искривление большого пальца (hallus valgus) (приобретенное);<br>Привычный вывих надколенника;<br>Привычный подвывих надколенника;<br>Другие спонтанные разрывы связки(ок) колена;<br>Внутреннее поражение коленного сустава неуточненное;<br>Другие врожденные деформации стопы | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография стопы<br>УЗИ пораженного сегмента*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал-натрия*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. Массаж. | 2 | 30 | Повышение опороспособности нижних конечностей, восстановление длины и устранение деформации нижних конечностей. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201162 | M20.3<br>M20.4<br>M20.6 | Другие деформации большого пальца стопы (приобретенные);<br>Другие молоткообразные деформации стопы (приобретенные);<br>Приобретенные деформации пальца(цев) стопы неуточненные | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография стопы<br>УЗИ пораженного сустава*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал-натрия*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. Массаж. | 2 | 35 | Повышение опороспособности нижних конечностей, восстановление длины и устранение деформации нижних конечностей. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201163 | M21.2 | Сгибательная деформация | Ортопедический | консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава, сегмента<br>УЗИ пораженного сустава*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция.<br>Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин.<br>Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин.<br>Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам.<br>Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин.<br>Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ГБО*. ЛФК. Массаж. | 2 | 45 | Повышение опороспособности нижних конечностей, восстановление длины и устранение деформации нижних конечностей. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201164 | M21.7 | Разная длина конечностей (приобретенная) | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография пораженного сегмента<br><br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. Массаж. | 2 | 70 | Восстановление длины конечности или уменьшение разности в длине, устранение деформаций, улучшение функции конечности |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201165 | M22.2 | Нарушения между надколенником и бедренной костью | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава<br>УЗИ пораженного сустава<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог*<br>Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. Массаж. | 2 | 28 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201166 | M22.3<br>M22.4 | Другие поражения надколенника;<br>Хондромаляция надколенника | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава<br>УЗИ пораженного сегмента<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. Массаж. | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201167 | M22.8<br>M22.9<br>M23.1<br>M23.2 | Другие поражения надколенника;<br>Поражение надколенника неуточненное;<br>Дисковидный мениск (врожденный);<br>Поражение мениска в результате старого разрыва или травмы | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава<br>УЗИ пораженного сегмента<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки.ЛФК. Массаж. | 2 | 30 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201168 | M23.0<br>M23.3<br>M23.4<br>M70.5<br>M72.3<br>M87.2 | Кистозный мениск;<br>Другие поражения мениска;<br>Свободное тело в коленном суставе;<br>Другие бурситы коленного сустава;<br>Узелковый фасциит;<br>Остеонекроз, обусловленный перенесенной травмой | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава<br>УЗИ пораженного сустава<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК.<br>Массаж. ГБО*. | 2 | 21 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201169 | M23.6<br>M23.9 | Другие спонтанные разрывы связки(ок) колена; Внутреннее поражение коленного сустава неуточненное | Ортопедический | консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава<br>УЗИ пораженного сустава<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК.<br>Массаж. ГБО.* | 2 | 30 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201170 | M23.8 | Другие внутренние поражения колена | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава УЗИ<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК.<br>Массаж. ГБО.* | 2 | 21 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201171 | M24.3 | Патологическое смещение и подвывих сустава, не классифицированное в других рубриках | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Функциональная рентгенография сустава<br>Рентгенография сустава<br>УЗИ пораженного сустава<br><br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК.<br>Массаж. ГБО.* | 2 | 35 | Уменьшение болевого синдрома, улучшение функции конечности. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201172 | M24.5 | Контрактура сустава | Ортопедический | консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Функциональная рентгенография сустава<br>УЗИ пораженного сегмента<br><br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен, метамизол. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК.<br>Массаж. ГБО.* | 2 | 21 | Уменьшение болевого синдрома, улучшение функции конечности. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201173 | M24.6<br>M25.2 | Анкилоз сустава;<br>Болтающийся сустав | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава<br>УЗИ пораженного сегмента*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки.ЛФК.<br>Массаж. | 2 | 30 | Повышение опороспособности нижних конечностей, восстановление длины и устранение деформации нижних конечностей. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201174 | M25.3 | Другая нестабильность сустава | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава<br>УЗИ пораженного сегмента<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки.ЛФК.<br>Массаж. | 2 | 35 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201175 | M25.7<br>M66<br>M66.0<br>M67<br>M67.2<br>M67.8 | Остеофит;<br>Спонтанный разрыв синовиальной оболочки и сухожилия;<br>Разрыв подколенной кисты;<br>Другие нарушения синовиальных оболочек и сухожилий;<br>Синовиальная гипертрофия, не классифицированная в других рубриках;<br>Другие уточненные поражения синовиальной оболочки и сухожилия | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента, сустава<br>УЗИ пораженного сегмента*<br>Флюорография легких | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки.ЛФК. Массаж. | 2 | 21 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201176 | M70.4<br>M71.2<br>M71.3 | Препателлярный бурсит;<br>Синовиальная киста подколенной области [Бейкера];<br>Другая киста синовиальной сумки | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава<br>УЗИ пораженного сегмента*<br>Флюорография легких | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки.ЛФК.<br>Массаж. | 2 | 14 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201177 | M86.6 | Другой хронический остеомиелит | Ортопедическая | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава<br>УЗИ пораженного сегмента*<br>Флюорография легких | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин . Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 2 | 60 | Восстановление длины конечности или уменьшение разности в длине, устранение деформаций, улучшение функции конечности |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201178 | M85.8 | Другие уточненные нарушения плотности и структуры костей | Ортопедическая | Консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава<br>УЗИ пораженного сегмента*<br>Флюорография легких | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 2 | 30 | Купирование процесса, анатомо-функциональное восстановление |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201179 | M89.0<br>M92.5 | Алгонейродистрофия; Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава<br>КТ-исследование сегмента<br>УЗИ пораженного сустава<br>ЭМГ-исследование<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин,. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 2 | 28 | Уменьшение болевого синдрома, улучшение функции конечности. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201180 | M93.2 | Рассекающий остеохондрит | Ортопедический | Консервативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента<br>УЗИ пораженного сегмента*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 2 | 30 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201181 | Q65.0 | Врожденный вывих бедра односторонний | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение. | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава<br>КТ-исследование сегмента*<br>УЗИ пораженного сустава<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*.<br>Скелетное вытяжение*.<br>Закрытое вправление бедра*.<br>Фиксация гипсовой повязкой.<br>Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен.<br>Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин.<br>Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин.<br>Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин.<br>Перевязки.<br>Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки.<br>ЛФК. ГБО*. Массаж. | 2 | 21 | Вправление и стабилизация головки во впадине, выравнивание длины и улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201182 | Q65.1 | Врожденный вывих бедра двусторонний | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава<br>КТ-исследование сегмента*<br>УЗИ пораженного сустава<br><br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*.<br>Скелетное вытяжение*.<br>Закрытое вправление бедра*.<br>Фиксация гипсовой повязкой.<br>Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен.<br>Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин.<br>Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин.<br>Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин.<br>Перевязки.<br>Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки.<br>ЛФК. ГБО*. Массаж. | 2 | 30 | вправление и стабилизация головки во впадине, выравнивание длины н. конечностей улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201183 | Q66.2<br>Q66.7 | Варусная стопа;<br>Полая стопа [pes cavus] | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография стопы<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Закрытая коррекция положения стопы, фиксация гипсовой повязкой. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 2 | 45 | Повышение опороспособности нижних конечностей, восстановление длины и устранение деформации нижних конечностей. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201184 | Q68.1 | Врожденная деформация кисти | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография кисти<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 2 | 45 | Коррекция деформации, улучшение функции кисти. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201185 | Q70.2<br>Q70.3 | Сращение пальцев стопы; Перепончатость пальцев стопы | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография стопы<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 2 | 21 | Повышение опороспособности нижних конечностей, восстановление длины и устранение деформации нижних конечностей. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201186 | T79.6 | Травматическая ишемия мышцы | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента<br>ЭМГ-исследование<br>УЗДГ-исследование<br>УЗИ пораженного сустава<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 2 | 14 | Уменьшение болевого синдрома, улучшение функции конечности. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201187 | Z89.4 | Приобретенное отсутствие стопы и лодыжки | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 2 | 45 | Повышение опороспособности нижних конечностей, восстановление длины и устранение деформации нижних конечностей. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201188 | B91 | Последствия полиомиелита | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента<br>ЭМГ-исследование<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 35 | Коррекция деформации, улучшение функции конечности |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201189 | M11<br>M14.0*<br>M17.3<br>M17.9<br>M19.2<br>M22<br>M23.0<br>M23.1<br>M23.2<br>M23.3<br>M23.8<br>M23.9<br>M24.0<br>M65<br>M93.2 | Другие кристаллические артропатии;<br>Подагрическая артропатия вследствие ферментных дефектов и других наследственных нарушений;<br>Другие посттравматические гонартрозы;<br>Гонартроз неуточненный;<br>Другой вторичный артроз;<br>Поражения надколенника;<br>Кистозный мениск;<br>Дисковидный мениск (врожденный);<br>Поражение мениска в результате старого разрыва или травмы;<br>Другие поражения мениска;<br>Другие внутренние поражения колена;<br>Внутреннее поражение коленного сустава неуточненное;<br>Свободное тело в суставе;<br>Синовиты и теносиновиты;<br>Рассекающий остеохондрит | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 30 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201190 | M14.1*<br>M14.5*<br>M16<br>M17.0<br>M17.2<br>M19.0<br>M21.0<br>M21.1<br>M21.3<br>M21.4<br>M21.6<br>M22.2<br>M24.5<br>M24.6<br>M25.2<br>M87.0<br>M87.1<br>M87.2 | Кристаллическая артропатия при других обменных болезнях;<br>Артропатия при других болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;<br>Коксартроз [артроз тазобедренного сустава];<br>Первичный гонартроз двусторонний;<br>Посттравматический гонартроз двусторонний;<br>Первичный артроз других суставов;<br>Вальгусная деформация, не классифицированная в других рубриках;<br>Варусная деформация, не классифицированная в других рубриках;<br>Свисание стопы или кисти (приобретенное);<br>Плоская стопа [pes planus] (приобретенная);<br>Другие приобретенные деформации лодыжки и стопы;<br>Нарушения между надколенником и бедренной костью;<br>Контрактура сустава;<br>Анкилоз сустава;<br>Болтающийся сустав;<br>Идиопатический асептический некроз кости;<br>Лекарственный остеонекроз;<br>Остеонекроз, обусловленный перенесенной травмой | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>мочевая кислота<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*.<br>Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен.<br>Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин.<br>Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин.<br>Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин.<br>Перевязки.<br>Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки.<br>ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома, восстановление длины и устранение деформации нижних конечностей, функционально-выгодное положение конечности. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201191 | M17.1<br>M17.3 | Другой первичный гонартроз;<br>Другие посттравматические гонартрозы | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава УЗИ пораженного сегмента*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 30 | Улучшение опорности конечности, функции сустава, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201192 | M17.4<br>M17.5<br>M19.0 | Другие вторичные гонартрозы двусторонние;<br>Другие вторичные гонартрозы;<br>Первичный артроз других суставов | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава УЗИ пораженного сегмента*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 45 | Улучшение опорности конечности, функции сустава, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201193 | M19.1 | Посттравматический артроз других суставов | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава<br>УЗИ пораженного сегмента*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 21 | Купирование болевого синдрома, улучшение функции сустава. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201194 | M21.7 | Разная длина конечностей (приобретенная) | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 60 | Восстановление длины конечности или уменьшение разности в длине, устранение деформаций, улучшение функции конечности |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201195 | M22.3<br>M22.4<br>M22.8<br>M22.9 | Другие поражения надколенника;<br>Хондромаляция надколенника;<br>Другие поражения надколенника;<br>Поражение надколенника неуточненное | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента<br>УЗИ пораженного сустава<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 35 | Улучшение опорности конечности, функции сустава, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201196 | M23.4 | Свободное тело в коленном суставе | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента<br>УЗИ пораженного сустава<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 28 | Улучшение опорности конечности, функции сустава, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201197 | M23.5 | Хроническая нестабильность коленного сустава | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента<br>УЗИ пораженного сустава<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 30 | Улучшение опорности конечности, функции сустава, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201198 | M23.6<br>M24.2 | Другие спонтанные разрывы связки(ок) колена; Поражение связок | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента<br>УЗИ пораженного сустава<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 35 | Улучшение опорности конечности, функции сустава, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201199 | M24.7 | Протрузия вертлужной впадины | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента<br>УЗИ пораженного сустава*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 60 | Уменьшение болевого синдрома и хромоты, улучшение опорности конечности. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201200 | M25.3<br>M25.6 | Другая нестабильность сустава;<br>Тугоподвижность в суставе, не классифицированная в других рубриках | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сустава<br>УЗИ пораженного сустава<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 35 | Улучшение опорности конечности, функции сустава, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201201 | M65 | Синовиты и теносиновиты | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента<br>КТ-исследование<br>УЗИ пораженного сегмента*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 30 | Улучшение стато-динамической функции конечности, сустава, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201202 | M84<br>M84.1<br>M86.5<br>M86.6<br>M89.2 | Нарушения целостности кости;<br>Несрастание перелома [псевдоартроз];<br>Другие хронические гематогенные остеомиелиты;<br>Другой хронический остеомиелит;<br>Другие нарушения роста и развития костей | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента<br>КТ-исследование<br>УЗИ пораженного сегмента*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 75 | Достижение сращения кости, улучшение функции конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома, замещение дефекта кости, восстановление длины конечности или уменьшение разности в длине, устранение деформаций. Купирование острого инфекционного процесса. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201203 | M87.3<br>M87.8<br>M87.9<br>M91.1<br>M92.5<br>M93.0 | Другой вторичный остеонекроз;<br>Другой остеонекроз;<br>Остеонекроз неуточненный;<br>Юношеский остеохондроз головки бедренной кости [Легга-Кальве-Пертеса];<br>Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей;<br>Соскальзывание верхнего эпифиза бедренной кости (нетравматическое) | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента<br>КТ-исследование<br>УЗИ пораженного сустава*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 60 | Улучшение стато-динамической функции конечности, сустава, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201204 | M93.2 | Рассекающий остеохондрит | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента<br>КТ-исследование<br>УЗИ пораженного сустава*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 30 | Улучшение стато-динамической функции конечности, сустава, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201205 | M96.0 | Псевдоартроз после сращения или артродеза | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента<br>КТ-исследование<br>УЗИ пораженного сустава*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 75 | Достижение сращения кости, улучшение стато-динамической функции конечности, сустава, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201206 | P14.0<br>Q65.0 | Паралич Эрба при родовой травме;<br>Врожденный вывих бедра односторонний | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента<br>КТ-исследование<br>УЗИ пораженного сустава*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 45 | Улучшение стато-динамической функции конечности, сустава, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201207 | Q65.1 | Врожденный вывих бедра двусторонний | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента<br>КТ-исследование<br>УЗИ пораженного сустава*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Закрытое вправление подвывиха бедра, фиксация гипсовой повязкой. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен. Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 60 | Вправление и стабилизация головки во впадине, выравнивание длины нижних конечностей улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201208 | Q65.3<br>Q65.4<br>Q65.8 | Врожденный подвывих бедра односторонний;<br>Врожденный подвывих бедра двусторонний;<br>Другие врожденные деформации бедра | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента<br>КТ-исследование<br>УЗИ пораженного сустава*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Закрытое вправление подвывиха бедра, фиксация гипсовой повязкой. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 45 | Улучшение взаимоотношений в тазобедренном суставе, выравнивание длины нижних конечностей, улучшение стато-динамических функций конечности. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201209 | Q66.0<br>Q66.1<br>Q66.4<br>Q66.5<br>Q68.1<br>Q68.2<br>Q68.4<br>Q68.8<br>Q71 | Конско-варусная косолапость;<br>Пяточно-варусная косолапость;<br>Пяточно-вальгусная косолапость;<br>Врожденная плоская стопа [pes planus];<br>Врожденная деформация кисти;<br>Врожденная деформация колена;<br>Врожденное искривление большеберцовой и малоберцовой костей;<br>Другие уточненные врожденные костно-мышечные деформации;<br>Дефекты, укорачивающие верхнюю конечность | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента<br>КТ-исследование<br>УЗИ пораженного сустава*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 45 | Повышение опороспособности нижних конечностей, восстановление длины и устранение деформации нижних конечностей. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201210 | M84<br>M84.1<br>M85.8<br>M86.4<br>M86.5<br>M86.6<br>Q71.4<br>Q71.5<br>Q71.8<br>Q72<br>Q72.3<br>Q72.8<br>Q74.3 | Нарушения целостности кости;<br>Несрастание перелома [псевдоартроз];<br>Другие уточненные нарушения плотности и структуры костей;<br>Хронический остеомиелит с дренированным синусом;<br>Другие хронические гематогенные остеомиелиты;<br>Другой хронический остеомиелит;<br>Продольное укорочение лучевой кости;<br>Продольное укорочение локтевой кости;<br>Другие дефекты, укорачивающие верхнюю(ие) конечность(ти);<br>Дефекты, укорачивающие нижнюю конечность;<br>Врожденное отсутствие стопы и пальца(ев) стопы;<br>Другие дефекты, укорачивающие нижнюю(ие) конечность(ти);<br>Врожденный множественный артрогрипоз | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография сегмента<br>КТ-исследование<br>УЗИ пораженного сустава*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 75 | Достижение сращения кости, улучшение стато-динамической функции конечности, сустава, уменьшение хромоты и болевого синдрома. Восстановление длины или уменьшение разности в длине, устранение деформации конечностей. Купирование острого инфекционного процесса. |
| 5201211 | Q72.4<br>Q72.5<br>Q72.6 | Продольное укорочение бедренной кости;<br>Продольное укорочение большеберцовой кости;<br>Продольное укорочение | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, | 3 | 60 | Восстановление длины или уменьшение разности в длине, |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | малоберцовой кости | | | HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография пораженного сегмента<br>КТ-исследование пораженного сегмента*<br>УЗИ пораженного сегмента*<br>Флюорография органов грудной клетки | Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*. Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | | | | устранение деформации конечностей. Улучшение стато-динамической функции конечности, сустава, уменьшение хромоты. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201212 | Q74.1 | Врожденная аномалия коленного сустава | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография коленного сустава<br>КТ-исследование коленного сустава*<br>УЗИ пораженного сустава*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 35 | Устранение деформации конечности. Улучшение стато-динамической функции конечности, сустава, уменьшение хромоты. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201213 | Q74.8<br>Q77.4<br>Q77.7 | Другие уточненные врожденные аномалии конечности(ей);<br>Ахондроплазия;<br>Спондилоэпифизарная дисплазия | Ортопедический | Оперативное лечение | Клинический анализ крови<br>Анализ мочи общий<br>Кал на я/глист<br>Анализ крови на ВИЧ<br>Анализ крови на HbS-антиген<br>Анализ крови на гепатит 'С'<br>Анализ крови на RW<br>Биохимический анализ крови: общий белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>трансаминазы<br>сулемовая проба<br>тимоловая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар крови<br>ПТИ<br>Группа крови<br>Резус-фактор<br>ЭКГ*<br>Рентгенография пораженного сегмента<br>КТ-исследование пораженного сегмента*<br>УЗИ пораженного сустава*<br>Флюорография органов грудной клетки | Терапевт<br>Анестезиолог<br>Невропатолог* Хирург*<br>Сосудистый хирург*<br>Нейрохирург*<br>Физиотерапевт*<br>Кардиолог*<br>Ревматолог* | Анестезия: местная*, проводниковая*, внутривенный наркоз*, общий наркоз*. Ср-ва для проведения анестезии: прокаин*, лидокаин*, бупивакаин*, ропивакаин*, кетамин*, натрия оксибутират*, пропофол*, тиопентал натрия*, севофлуран*, пипекурония бромид*, суксаметония йодид*. Операция. Анальгетики: трамадол, кетопрофен. Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию*: ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин. Антикоагулянты*: гепарин натрия, фраксипарин. НПВС*: диклофенак, ибупрофен.<br>Антигистаминные средства*: дифенгидрамин, хлоропирамин. Ср-ва для проф-ки и лечения инфекций*: ампициллин*, гентамицин*, левофлоксацин*, метронидазол*, хлорамфеникол*, цефотаксим*, цефазолин*, ципрофлоксацин*, флуконазол*.<br>Седативные средства*: диазепам. Спазмолитики, миорелаксанты*: дротаверин. Перевязки. Физиотерапевтическое лечение*: лазеротерапия*, магнитотерапия* электролечение*, фонофорез*, грязелечение*, парафинотерапия*. Перевязки. ЛФК. ГБО*. Массаж. | 3 | 90 | Восстановление длины или уменьшение разности в длине, устранение деформации конечностей. |